


Sebagai usaha untuk mencegah alergi, dianjurkan untuk memberikan bayi Anda ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya.




Deteksi Dini

Risiko Alergi

Segera hubungi dokter Anda untuk penjelasan lebih lanjut.

Apakah bayi Anda memiliki risiko alergi?

Risiko alergi pada bayi



Bila kedua orangtua memiliki manifestasi yang sama maka risiko terkena alergi meningkat 60-80%

Nilai keluarga yang diprediksi digunakan untuk menentukan kemungkinan bayi terkena alergi

Nilai Keluarga	Tingkat risiko terkena alergi terhadap janin atau bayi baru lahir
0	Risiko kecil (5-15%)
1-3	Risiko sedang (20-40%)
4-6	Risiko tinggi (40-60%)

Konsultasikan dengan dokter Anda.

*Diadaptasi dari Yadau & Yadau, Causes & Prevention Allergy & Asthma, 2005

Berikan nilai terhadap semua anggota keluarga dengan tanda-tanda alergi: Dermatitis/eksim/kemerahan/diare/muntah/kolik/pilek/nafas berbunyi/asma sesuai dengan petunjuk berikut:

Nilai Kondisi

- 2 ⇒ ibu, bapak dan/atau salah satu saudara sekandung janin/bayi yang **dinyatakan** oleh dokter atau secara medis terkena alergi.
- 1 ⇒ ibu, bapak dan/atau salah satu saudara sekandung janin/bayi **diduga** terkena alergi
- 0 ⇒ ibu, bapak dan/atau salah satu saudara sekandung janin/bayi **tanpa riwayat** alergi apapun.

Gunakan tabel dibawah ini untuk mendapatkan tingkat risiko alergi pada janin atau bayi baru lahir. (beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai)

Keluarga	Dinyatakan	Diduga	Tanpa Riwayat	NILAI
Ibu				
Bapak				
Saudara sekandung Janin/Bayi				
Jumlah Nilai				

Risiko Alergi:

Konsultasikan dengan dokter Anda.